



Polen en la atmósfera de Querétaro



Durante la semana del 26 de julio al 2 de agosto del 2025 se registraron diversos tipos polínicos en la atmósfera. En este informe se presentan aquellos de mayor importancia con su concentración y nivel de alergenicidad.

Estación: Juriquilla, Qro.

<i>Acalypha</i> spp. (hierba del cáncer):	● (A)
Amaranthaceae (amarantos):	● (A)
Poaceae (gramíneas/pastos):	● (A)
Asteraceae (margaritas/cardos):	● (A)
<i>Ricinus communis</i> (higuerilla):	● (B)
Moraceae (moreras):	● (A)
<i>Mimosa</i> spp. (uña de gato):	● (A)

Estación: Centro Histórico, Qro.

<i>Acalypha</i> spp. (hierba del cáncer):	● (A)
Amaranthaceae (amarantos):	● (A)
Poaceae (gramíneas/pastos):	● (A)
Asteraceae (margaritas/cardos):	● (A)
Moraceae (moreras):	● (A)
<i>Schinus</i> spp. (pirul):	● (B)
<i>Salix</i> spp. (sauce llorón):	● (A)



Hierba del cáncer



Amarantos



Gramíneas/pastos



Margaritas/cardos



Moreras

Semáforo de los niveles de concentración (granos de polen/m³)

Nulo Bajo Moderado Alto Muy alto



Los niveles de concentración se basan en los intervalos de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI)

Niveles de alergenicidad

- Alto (A)
- Moderado (M)
- Bajo (B)

Esta información es obtenida en:



Autores: Mtra. Fátima Ojeda Flores y Viviana Beltrán Salazar